

# Avertissements agricoles

ISSN 00000000

DLP 26-7-86091756



Bulletin n° 17 du 08 juillet 1986


Numérotation continue : n° 17

**MAIS** : intensification du vol de la Pyrale

**CEREALES** : destruction du chiendent

**POIS** : ne pas intervenir sur la tordeuse

## MAIS :



Ponte de pyrale

- . Le vol de la Pyrale s'est intensifié dans tous les secteurs.
- . Les premières pontes sont observées depuis le 07 juillet.
- . Les dates de début de la période possible de traitement sont les suivantes :

**11 JUILLET** : zones précoces (VERDUN, BACCARAT-LUNEVILLE, CHATEAU-SALINS, Sud-Ouest-Meuse).

**15 JUILLET** : zone plus tardive (SARREBOURG).

- . Il est inutile d'intervenir actuellement contre les pucerons.

## CEREALES : Destruction du chiendent (Agropyron repens) :

La lutte chimique contre le chiendent rampant peut être envisagée avant la moisson de la céréale ou sur chaume de céréales.

### - Destruction avant la moisson :

Pour une bonne intervention, certaines conditions sont à remplir :

- . Céréales possibles : blé d'hiver, orge d'hiver, orge de printemps
- . Date d'application : humidité du grain inférieure à 25 %
- . Produit - Dose :
  - \* ROUNDUP 5 l/ha
  - \* ou associé à des adjuvants :
    - ROUNDUP 3 l/ha + GENAMIN T 200 1 l/ha
    - ROUNDUP 2,5 l/ha + FRIGATE 1 l/ha
- . Délai de récolte après traitement : 7 jours minimum
- . Précautions d'emploi :
  - \* ne pas traiter sur production de semences
  - \* après récolte, tout travail du sol peut être envisagé
- . Avantages :
  - \* facilite et augmente la rapidité de la moisson
  - \* Aucun danger pour le grain
  - \* meilleure efficacité que sur chaume.

Imprimerie de la Station de ~~Sixbox~~ NANCY

Directeur-Gérant ~~Dxxxxx~~ D. VERBEKE

Publication Périodique :

CPPAP N° : ~~xxxxxx~~ 2011 AD

Abonnement annuel : ~~xxxxxx~~ F.150 F

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Cité Administrative

54043 NANCY CEDEX

Tél : (8) 337.26.45.



728

**- Destruction dans les chaumes :**

Comparée à une lutte culturale (travail superficiel ou labour) aléatoire quant à l'efficacité, la lutte chimique apporte plus de sécurité.

Un grand nombre de produits ne seront efficaces au moment de leur application que si les chiendents sont en végétation active et, par ailleurs, que si les pailles ont été broyées ou récoltées afin d'éviter qu'elles fassent écran aux produits.

**Produits utilisables sur chiendents et sur chaumes**

Stade d'intervention sur la culture	Chiendent rampant	Matière active	Produit formulé	Dose/ha produit formulé	Conditions à respecter	Cultures suivantes possibles
SUR CHAUME DE CEREALES	X	aminotriazole	Nombreuses spécialités	20 l/ha	Labour un mois après traitement	Toutes cultures
	X	paraquat	GRAMOXONE 2000 (SOPRA)	1,5 l/ha à répéter	Déchaumage précoce, application sur des repousses de une à deux feuilles	Toutes cultures
	X	aminotriazole puis paraquat	Nombreuses spécialités puis gramoxone 2000 + mouillant (SOPAGRAL)	10 l puis 3 l + 1 l	Traiter sur chiendent bien reverdi, attendre 10 à 15 jours avant l'application du gramoxone 2000. Labourer quelques jours après le second herbicide	Toutes cultures
	X	glyphosate	ROUNDUP (MONSANTO)	. 3 l + 1 l genamin . 5 l . 2,5 l + 1 l fringate	Broyage ou enlèvement des pailles. Déchaumage puis traitement sur chiendent bien reverdi et en végétation poussante. Un délai d'une semaine doit être respecté avant toute intervention culturale	Toutes cultures
	X	dalapon	Nombreuses spécialités	10 à 12 kg	Labour fin d'automne ou début d'hiver	Toutes cultures de printemps si le labour est effectué à temps
	X	atrazine	Nombreuses spécialités	5 l ou kg	Application complémentaire de 2,5 l à 3 l d'atrazine formulée dès février avant le semis du maïs. Cette solution permet de limiter la persistance pour le blé qui suivra le maïs	Maïs au printemps après le traitement d'automne
	X	T.C.A.	Nombreuses spécialités	40-50 kg	Déchaumage précoce, incorporation puis labour d'hiver	Betteraves, pommes de terre, colza, pois et céréales de printemps